

ORIGINAL
NÃO PODE SER RETIRADO
DO
T-S-E



INSTITUTO
BUTANTAN
A serviço da vida

Segurança é o que todos querem sentir à flor da pele.

Berlison 1%



Um estranho no ninho.

PL 0544 UIM 05 84

Berlison 1%

ACETATO DE HIDROCORTISONA PURO

Ação natural conhecida e aprovada pelo organismo

Substâncias estranhas à natureza do organismo

A pesquisa com os corticóides tópicos tem procurado várias possibilidades para potencializar o efeito farmacológico destes compostos, através de modificações em sua estrutura molecular. Alterações na estrutura básica da hidrocortisona, ou formação de duplas ligações e adições, modificaram as propriedades dos corticóides (Löflier e Baines). Mas, sem dúvida, aumentaram em número correlatos sobre efeitos secundários. Desta forma, a ciência vem conseguindo modificar a ação natural do corticóide básico, a hidrocortisona, sem contudo conseguir evitar que o organismo manifeste reações secundárias a estas modificações.

AÇÃO NATURAL CONHECIDA E APROVADA PELO ORGANISMO

"A hidrocortisona é o principal corticóide secretado pela supra-renal" (Goodman e Gilman). "A hidrocortisona é o protótipo dos glicocorticóides" (Oliveira) e "juntamente com a cortisona são produzidas pelo próprio organismo, sendo que a cortisona só age após ser transformada em hidrocortisona pela hidrogenação hepática" (Miller).

BERLISON AGE NOS LOCAIS APROPRIADOS

"Os corticóides naturais, tais como a hidrocortisona, fixam-se com maior seletividade aos receptores epidérmicos específicos" (Baker) e isto confere a BERLISON uma aceitação melhor pelo tecido lesado, uma vez que a sua ação não difere em nada daquela produzida naturalmente pelo organismo.

BERLISON POSSUI EFICÁCIA CLÍNICA COMPARÁVEL A QUALQUER OUTRO CORTICÓIDE

"A hidrocortisona desde o início da era dos corticóides mostrou ser o mais importante composto deste grupo de substâncias, com eficácia superior à cortisona e comparável aos principais corticóides sintéticos" (Labhart).

INDICADO EM ECZEMAS E DERMATOSES

MAIOR CONFIANÇA PARA O MÉDICO
Em função de sua eficácia e extensa segurança, BERLISON é indicado no tratamento de eczemas e dermatoses, principalmente aquelas crônicas e/ou em áreas extensas.

BEM ACEITO PELOS PACIENTES
BERLISON é emoliente de odor agradável e discreto. BERLISON não contém os conhecidos sensibilizantes (parabenos, propileno-glicol, etc.), sendo útil no tratamento das lesões nos mais variados estágios de evolução.

AÇÃO NATURAL COMO FATOR DE SEGURANÇA

Único acetato de hidrocortisona puro tópico.
Ação antiinflamatória e antipruriginosa suficiente. Eficácia clínica comparável aos corticóides sintéticos. Praticamente isento de efeitos indesejáveis, se administrado conforme a posologia.

Berlison 1%

ACETATO DE HIDROCORTISONA PURO

Ação natural conhecida e aprovada como fator de segurança.

Em tratamentos prolongados (mais de 4 semanas) e/ou tratamento de áreas maiores (mais de 10% da superfície corporal), não pode ser excluído o aparecimento de efeitos colaterais locais, como atrofia da pele, telangiectasias, estrias e quadros acneiformes, ou efeitos sistêmicos por absorção do corticóide.

Apresentação
Bisnagas com 15 g e 30 g.

Contra-indicações
Processos tuberculosos e fúngicos na região a ser tratada; vírus (p. ex. varicela, varíola, herpes, etc.).

Posologia e modo de aplicação
Regia geral: aplicar uma camada fina de Berlison 1% 2 a 3 vezes por dia, sob ligeira fricção se for possível, após melhora do quadro clínico basta, muitas vezes, uma aplicação por dia.

Em lactentes e crianças menores de 4 anos, o tratamento não deveria prolongar-se por mais de 3 semanas, especialmente nas zonas cobertas por fraldas.



Para maiores informações consulte os nossos impressos mais detalhados

Bibliografia:
Löflier, A. & Baines, A. — Pharmacotherapeutica, 15: 305-318, 1976.
Purdy, M. J. — Drugs, 8, 70-77, 1974.
Goodman & Gilman — As bases farmacológicas da terapêutica, Ed. Guanabara Koogan, 4ª edição, 1973 p. 1506.
Oliveira, I. R. — F. Med. (BR) 86(3): 129-138, 1983.
Miller, O. — Jornal Bras. Medicina, 30, 3, 98-107, 1976.
Baker, J. R. J. et al — Brit. J. Dermatol., 96, 171-178, 1977.
Labhart, A. — "Klinik der inneren sekretion", in: Löflier & Baines — Pharmacotherapeutica, 15: 305-318, 1976.
Shering AG, Concessionária de: Berlison Ltda.

Composição
Formada de acetato de hidrocortisona.

Indicações
1 g de Berlison 1% contém 10 mg de acetato de hidrocortisona.

Indicações
Todas as dermatoses inflamatórias e alérgicas que respondem à corticoterapia tópica, como:
Dermatites e eczemas vulgares, de contato, profissional, numular, seborreico, disidrotico, microbiano, degenerativo.
Eczema atópico (infantil, endógeno, neurodermite).
Eczema anal.
Eczema varicoso (não aplicar o medicamento diretamente sobre a zona ulcerada, aberta).
Eritema solar, queimaduras de 1º grau, picadas de inseto.

Posologia e modo de aplicação
Regia geral: aplicar uma camada fina de Berlison 1% 2 a 3 vezes por dia, sob ligeira fricção se for possível, após melhora do quadro clínico basta, muitas vezes, uma aplicação por dia.

Em lactentes e crianças menores de 4 anos, o tratamento não deveria prolongar-se por mais de 3 semanas, especialmente nas zonas cobertas por fraldas.